



Hepatitis e:

Los síntomas aparecen entre 1-9 meses después de tener contacto con el virus causante de la hepatitis C. Esta se contagia a través de relaciones sexuales, contacto sanguíneo con alguna persona infectada, compartir jeringas para inyectarse drogas o cualquier otra sustancia, a sí como una madre infectada durante el parto puede contagiar a su bebe.

Muchas personas presentan estos síntomas leves, como sensación de gripe que no desaparece, cansancio, color amarillento de la piel (ictericia), orina de color oscuro y daños permanentes al hígado.

VIH Y SIDA:

Los síntomas aparecen varios meses o varios años después de tener el contacto con el virus, el cual puede estar presente por muchos años sin que se vean los síntomas. Se transmite durante las relaciones sexuales, contacto con sangre infectada, compartir jeringas y una madre infectada puede contagiar a su bebe en la matriz, durante el parto o al amamantarlo.

Los síntomas principales son: Pérdida de peso, cansancio, diarreas, aumento de tamaño de los nódulos linfáticos.

Signos y síntomas Generales:

Los siguientes síntomas pueden indicar si usted tiene una ITS.

Si observa cualquiera de estos síntomas, acuda a un médico. No lo dejes para más tarde!

Mujeres:

- ~ Flujo u olor anormal en la vagina.
- ~ Dolor en el área de la pelvis, (lugar entre el ombligo y la vagina).
- ~ Quemazón o picor alrededor de la vagina.
- ~ Sangrado por la vagina que no es una regla normal.
- ~ Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales.


Tanto en hombres como mujeres:

- ~ Llagas, ronchas o ampollas en los órganos sexuales, ano o la boca.
- ~ Ardor y dolor al orinar o al mover el vientre.
- ~ Necesidad de orinar continuamente.
- ~ Comezón alrededor de los órganos sexuales.
- ~ Garganta roja o inflamada.
- ~ Síntomas de gripe, fiebre, escalofríos y dolores.
- ~ Inflamación alrededor de los órganos.

Prevención:

La manera más eficaz de prevenir las infecciones de transmisión sexual es evitar las relaciones sexuales sin protección.

Los preservativos o condones son una buena barrera de protección contra las ITS.



Ars Amor y Paz



ASEMAP.

Por amor a tu salud!

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)



Dirección: Ave. La Las Américas No. 24, Ens. Ozama.
Teléfono: (809) 335-5000 y desde el interior (1-809) 200-8222.
Horario: Corrido de lunes a viernes de 08:00AM a 06:00PM
y los sábados de 08:00AM a 12:00M.

Las enfermedades de Transmisión Sexual.

También conocidas como Infección de Transmisión Sexual (ITS), son un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas por tener en común la misma vía de transmisión: se transmiten de persona a persona solamente por medio de contactos íntimos (que se produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales anal, oral, vaginal).

El HIV y la Hepatitis e también pueden transmitirse por medio de contacto con sangre infectada. Actualmente se conocen 30 tipos de ITS, de las cuales 26 atacan principalmente a las mujeres y 4 a ambos sexos.

Etiología: Las infecciones de transmisión sexual generalmente se agrupan según los síntomas y signos que producen.

Tanto la sífilis como el herpes genital producen úlceras (llagas) sobre la piel o sobre la membrana que cubre la vagina o la boca.

La gonorrea como las infecciones clamidiales causan uretritis (inflamación y secreción de la uretra) en los hombre, cervicitis (inflamación y secreción del cérvix o cuello uterino) en las mujeres e infecciones oculares en los recién nacidos. Infección por clamidias o uretritis no especificada:

Los síntomas aparecen entre los 7-21 días después de tener relaciones sexuales. Las mujeres presentan desecho vaginal y los hombres gotas de líquido blanco o amarillento que salen por el pene. Se transmite durante las relaciones sexuales, ya sea por la vagina, ano y también durante el sexo oral. Estas pueden causar daño a los órganos reproductores y esterilización en ambos sexos.

Verrugas Genitales

Los síntomas aparecen entre 1-8 meses después de tener relaciones sexuales. Se observan pequeñas verrugas en los órganos sexuales y el ano. Se siente ardor y comezón alrededor de los órganos sexuales.

Estas verrugas aparecen cada vez más y es más difícil de curar, una madre puede contagiar a su bebe durante el parto y pueden causar problemas que más adelante pueden convertirse en cáncer.

Gonorrea:

Los síntomas aparecen entre 2-21 días después de tener relaciones sexuales.

Secreción espesa amarilla o blanca de la vagina o del pene con ardor al orinar y al defecar. En las mujeres aparecen regla anormal, calambres y ardor en la parte baja del abdomen, se transmite pro relaciones sexuales, vagina, ano y sexo oral. Puede causar esterilidad, daños al corazón, artritis y ceguera.

Herpes:

Los síntomas aparecen entre los 2-30 días después de tener relaciones sexuales, algunas personas no presentan síntomas otras presentan pequeñas y dolorosas ampollas en los órganos sexuales y en la boca.



Vaginitis

Se presenta con ardor, comezón o dolor en la vagina. Los hombres pueden contraer infecciones en el pene, próstata y uretra.

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de un flujo anormal, de color amarillento y maloliente.



Sífilis

Es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por la bacteria Treponema Pallidum. Esta enfermedad tiene varias etapas, la primaria, secundaria, latente y terciaria (tardía).

Etapas primaria:

Los síntomas aparecen entre las 3-12 semanas después de tener las relaciones sexuales, aparecen una o más llagas de color rojizo café en la boca, o en los órganos. En esta etapa los síntomas son difíciles de detectar, por lo general no causan dolor y, una persona que no ha sido tratada puede infectar a otra durante esta etapa.

Etapas secundaria:

Los síntomas aparecen en 1 semana a 6 meses después que las llagas desaparecieron. Aparecen salpullidos en cualquier parte del cuerpo, sensación de gripe, fiebre leve, inflamación de los ganglios linfáticos y pérdida del cabello.